

Sterillium Med, 13451 N

Datum dagtekening besluit: 25 maart 2026

Professioneel gebruik

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)* voor:

- hygiënische handdesinfectie;
- chirurgische handdesinfectie.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel gebruik.

*Virusclaims zijn gedefinieerd in EN14885. Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder 'uitleg virusclaim'.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het middel kan worden gebruikt in ziekenhuizen, en overige instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens en laboratoria.

Handen en onderarmen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. Het middel onverdund aanbrengen.

Hygiënische handdesinfectie:

De droge handen moeten gedurende 30 seconden met minstens 3 ml Sterillium med ingesmeerd worden. De handen moeten tijdens de gehele inwerktijd vochtig worden gehouden. Daarna de handen goed laten drogen en niet afspoelen.

Dosering: 3 ml voor beide handen samen (bij gebruik pompflacon – 2x pompen voor 3 ml)

Minimale inwerktijd: 30 seconden

Chirurgische handdesinfectie:

Sterillium med zo op de handen en onderarmen aanbrengen, dat alle huid bedekt is. Zo vaak insmeren als nodig is om de huid gedurende de gehele inwerktijd vochtig te houden. Daarna de handen en onderarmen goed laten drogen en niet afspoelen.

Dosering: minstens 2x3 ml voor beide handen samen (bij gebruik pompflacon – 4x pompen voor 6 ml)

Minimale inwerktijd: 1,5 minuut

N.B: Vermijd contact met de ogen en open vuur.